



Курение будущей матери во время беременности в три раза увеличивает риск развития менингита у ее ребенка в последующие годы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Ноттингема.

Родительское курение увеличивает опасность развития **менингита у детей**, как установили британские ученые. Если будущая мама **курит во время беременности**

, то опасность развития тяжелой болезни у ее ребенка в последующие годы вырастает в три раза. Если родители "обкуривают" малыша дома или на улице, то риск менингита увеличивается в два раза. В Великобритании более 600 детей каждый год становятся жертвами этого смертельно опасного заболевания из-за вторичного курения родителей.

Ученые из Ноттингема проанализировали 18 исследований, авторы которых искали связь между пассивным курением и **менингитом у детей**. Получены новые убедительные аргументы в пользу того, чтобы будущие родители отказывались от вредной привычки, способной разрушить не только их собственное здоровье, но и жизнь малыша. Доказано, что губительное воздействие табачного дыма на ребенка начинает сказываться еще в утробе матери.

По мнению ученых, сигаретный дым постепенно ослабляет иммунную систему ребенка, что делает его более уязвимым перед разными болезнями. Только в Великобритании менингитом каждый год заболевают по 2 500 человек. Чаще всего эта страшная болезнь поражает детей моложе 5 лет. Каждый 20-й пациент умирает, а у каждого шестого остаются тяжелые повреждения, включая ампутацию конечностей и травмы мозга.

В детском менингите виновато курение во время беременности

Автор: Administrator
24.05.2013 19:38 -

Менингит вызывается инфекцией защитных мембран, окружающих мозг и позвоночник. Если пациент не получит быстрого лечения, то болезнь может вызвать повреждение мозга и нервов. Среди симптомов менингита сильная головная боль, сыпь, рвота, высокая температура и боязнь яркого света.