



В первые месяцы жизни малышам не следует часто давать лекарства, содержащие парацетамол. Ученые выяснили, что из-за этого у детей существенно вырастает риск образования астмы к моменту поступления в детский сад.

Исследователи из Университета Копенгагена установили, что чем чаще в первый год жизни ребенок получает **парацетамол** или препараты на его основе, тем выше последующая опасность развития у него дыхательных проблем, включая астму. Данные исследования опубликованы в журнале *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. Это еще одно доказательство существования потенциальной связи между применением **парацетамола**

и
детской астмой

Впрочем, сами исследователи уверяют, что им не удалось установить прямую причинно-следственную связь. Профессор Ханс Бисгаард в этой связи рекомендует родителям применять парацетамол для помощи детям только в самых неотложных случаях. К примеру, когда у ребенка устойчиво держится очень высокая температура. В этом случае использование парацетамола вполне оправданно и идет на пользу здоровью малыша.

В сферу внимания исследователей из Дании попали 336 детей, за здоровьем которых они наблюдали от рождения и до семи лет. У всех малышей мамы страдали от астмы, что помещало и их самих в группу риска. К трем годам у 19% наблюдаемых проявились первые симптомы **детской астмы**, но они более часто встречались у тех детей, которые

Парацетамол может стать причиной детской астмы

Автор: Administrator
23.04.2013 11:35 -

получали больше парацетамола.

Так на каждое двукратное увеличение количества дней, во время которых ребенок получал это лекарство, риск развития астмы к трем годам вырастал на 28%. Впрочем, ставшие жертвой этого недуга дети вполне могли быть болезненными от рождения, что и заставляло их родителей давать им парацетамол.